

Резюме:

- ❑ COVID-19 может сопровождаться рядом проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта.
- ❑ Заболевание требует внимательного соблюдения алгоритмов лечения и правильных действий как для лечения основных проявлений, так и профилактики лекарственных поражений желудочно-кишечного тракта и полипрагмазии.
- ❑ Использование ИПП не является независимым фактором риска заболевания COVID-19 и тяжелого течения
- ❑ Рациональный подход к профилактике НПВП-ассоциированных поражений желудка и 12-перстной кишки позволит избежать жизнеугрожающих осложнений и будет способствовать более быстрому восстановлению после болезни.



TAKE HOME MESSAGES

1. ИПП не повышают риск заражения COVID-19 при соблюдении мер гигиены
2. ИПП должны назначаться пациентам только по показаниям
3. Лечебно-профилактические подходы при НПВП-гастроэнтеропатии включают оценку рисков, рациональное назначение НПВП, применение ИПП и ребамипида
4. *H. pylori* – дополнительный фактор риска НПВП-гастропатии, а также желудочно-кишечных кровотечений у пациентов на фоне приема НПВП и антитромботической терапии.
5. Противопоказаний к эрадикационной терапии, обусловленных пандемией COVID-19 нет.

